

Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartroplastiek

Productcategorie	Preoperatief
Aanbieder	Fysiotherapie
Specialisme	Orthopedie
Patiëntengroep	Totale heupartroplastiek en totale knieartroplastiek (THA/TKA)
Inhoud	
Preoperatief onderzoek	<p>De preoperatieve activiteiten van de fysiotherapeut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korte functioneel georiënteerde anamnese, rekening houdend met sociale en maatschappelijke aspecten als woonomgeving, mantelzorg en arbeidsomstandigheden - het uitvoeren van diagnostiek gericht op de functionele status - functionele status van de individuele patiënt omzetten in een prognose voor klinisch en postklinisch functioneel herstel na de operatie, rekening houdend met bevorderende en belemmerende factoren (coping, pijn, co-morbiditeiten) - therapie-initiatie bij patiënten met een hoog risico op vertraagd functioneel herstel voor een preoperatief trainingstraject ter verbetering van het fysiek functioneren (transmuraal netwerk)
Poliklinische zitting Fysiotherapie	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toepassen van functionele diagnostiek om een prognose te kunnen maken van het postoperatief functioneel herstel. Daarvoor worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld: BMI, geslacht, Charnley score, Timed up and go test, leeftijd - adviezen voor ontslag/vervolginstelling, hulpmiddelen en ADL in de postklinische fase - participeren in multidisciplinair overleg over ontslagbestemming en risicostratificatie (afdelingsoverleg en MDO) - waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg over ontslag en planning (inschatten opnameduur en ontslagbestemming)
Resultaat	<p>Het verkrijgen van een optimaal beeld van de functionele gezondheid van de patiënt vlak voor de ingreep. Dit dient kapstok voor risicostratificatie voor het functioneel herstel en waar nodig therapie-initiatie in de preoperatieve fase. Dit alles om de patiënt de optimale mogelijkheden te bieden voor functioneel herstel.</p> <p>Wanneer tot preoperatieve fysiotherapeutische interventie wordt besloten, zal deze een periode van 3 tot 6 weken moeten beslaan om een optimaal resultaat te kunnen garanderen (advies BiBo KNGF).</p>

Productbeschrijving: Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartrose	Status: geëvalueerd + vastgesteld Datum: 10-12-2018	Evaluatiedatum: December 2020
Autorisator: Naam: Functie:	Vaste items Lokaal aan te passen	Pagina 1 van 2

Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartroplastiek

Literatuur/richtlijnen	<p><u>Literatuur:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mizner et al, Fortin et al, Roder et al, Malani et al. Functionele gezondheid en de invloed op postoperatief herstel. - Topp et al 2003, Hulzebos et al (2006), Dronkers et al (2008). Better in Better out (BiBo) concept, beschreven in literatuur door o.a. advies BiBo, uitgegeven door het KNGF. - Lopopolo et al (1999). Onderzoek over rolverandering van de ziekenhuisfysiotherapeut o.b.v. onder andere steeds meer werken met ketenzorg en zorgpaden - Elings et al. Art risicomodel, in voorbereiding - v.d. Sluis et al. Art risicomodel, in voorbereiding <p><u>Richtlijnen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - richtlijn KNGF-artrose heup en knie - gebruik van een gestandaardiseerd en wetenschappelijk onderbouwd meetprotocol - gebruik van ICF om het klinisch redeneren te standaardiseren - functieprofiel ziekenhuisfysiotherapeut (2010)
Kwaliteit fysiotherapeut	<p>BIG-registratie. De fysiotherapeut werkt volgens de richtlijnen en concepten zoals hierboven aangegeven en heeft voldoende kennis van het gebruikte meetprotocol. De fysiotherapeut beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden.</p>
Kosten	
Preoperatief onderzoek	
Poliklinische zitting Fysiotherapie	
Afsluiting en rapportage	
Inlichtingen en aanvragen	bij VLF = info@vlfnl.nl en NVZF = Secretariaat@nvzf.nl

Productbeschrijving: Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartrose	Status: geëvalueerd + vastgesteld Datum: 10-12-2018	Evaluatiedatum: December 2020				
Autorisator: Naam: Functie:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Vaste items</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lokaal aan te passen</td> </tr> </table>		Vaste items		Lokaal aan te passen	Pagina 2 van 2
	Vaste items					
	Lokaal aan te passen					